



Benefícios

- Precocidade**
- Produtividade**
- Qualidade de colmo e raiz**
- Ampla adaptação**
- Tolerância aos enfezamentos**
- Qualidade de grãos**

Reação a doenças

Antracnose de colmo

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cercosporiose

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Complexo mollicutes e viroses

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Diplodia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ferrugem branca

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Características agrônômicas

- Tecnologia recomendada **Média/Alta**
- Época de plantio **Safra/Safrinha**
- Finalidade de uso **Grãos**
- Maturidade relativa em dias (RM) **125**
- Tipo de grão **Semiduro alaranjado**
- Empalhamento **Ótimo**
- Arquitetura da folha **Semiereta**

Ferrugem comum

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ferrugem polissora

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fusarium

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Helmintosporiose

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mancha-branca

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A reação à doenças pode sofrer variações em função do ambiente e de ocorrência de forte pressão do patógeno.
Notas: 9 = alta tolerância | 1 = suscetível

Recomendações de plantio

Verão	Regiões edafoclimáticas	Setembro				Outubro				Novembro				Dezembro			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	RS/SC/PR (Baixo)																
	RS/SC/PR (Alto)																
	MG																
	SP																
	GO/DF																
	BA																
	TO																
	MT/RO																
	SE**																
	MA/PI																

** Época ideal de plantio de abril a junho, demais épocas sob consulta técnica.
- Recomendações referentes ao estande final de mil plantas/ha.

Safrinha	Regiões edafoclimáticas	Janeiro				Fevereiro				Março			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	PR/MS												
	SP												
	MT/RO												
	GO/DF (Alto)												
	MG												
	GO (Baixo)												
	Matopiba												

NR = Não Recomendado